

. MEYVE ZARARLILARI KİMYASAL SAVAŞIMI

1- AĞAÇ KIZILKURDU (*Cossus cossus* L.) (Lep : Cossidae)'NA KARŞI TAVSİYE EDİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) 100 lt suya
Cypermethrin 250 g/l	EC	80 ml
Dichlorvos 550 g/l	EC	200 ml

2-AĞAÇ SARIKURDU (*Zeuzera pyrina* (L.) (Lep.: Cossidae)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) 100 lt suya
Azinphos methyl % 25	WP	200 g
Azinphos methyl 230 g/l	EC	200 ml
Dichlorvos 550 g/l	EC	200 ml
Diazinon 185 g/l	EC	200 ml
Diazinon 630 g/l	EC	75 ml
Fenthion 525 g/l	EC	150ml
Chlorpyrifos ethyl 480 g/l	EC	200 ml
Dimethoate 400g/l	EC	150ml

3-AKARLAR Akdiken akarı (*Tetranychus viennensis* Zacher.) İkinoktalı Kırmızı örümcek (*Tetranychus urticae* Koch.) Avrupa Kırmızı örümceği (*Panonychus ulmi* Koch.) Meyve Kahverengi Akarı (*Bryobia rubrioculus* (Scheut.) Yassiakar (*Cenopalpus pulcher* (C.-F.)'A KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) 100 lt suya
Fenbutatin oxide 500 g/l	SC	30 ml
Omethoate 565 g/l	EC	125 ml
*Tetradifon 75.2 g/l	EC	200 ml
Dicofol 195 g/l	EC	150ml (Elma'da <i>T. viennensis</i> 'e karşı 100 ml)
Quinomethionate %25	WP	40 g
Kükürt %80	WP	400 g
Propargite 588 g/l	EC	75 ml (<i>P. ulmi</i> 'ye karşı 100 ml)
Amitraz 200 g/l	EC	150 ml (Elma'da <i>T. viennensis</i> 'e karşı 100ml)
Bromopropylate 500 g/l	EC	100 ml
Flubenzimine %50	WP	75 g
**Clofentezine 500 g/l	EC	20 ml
Ethoate methyl 420 g/l	EC	100ml (Şeftali'de)
Azocyclotin %25	WP	100 g
Hexythiazox 50 g/l	EC	50 ml
Formothion 336 g/l	EC	150ml
Triazophos 420 g/l	EC	100 ml
Bifenthrin 100g/l	EC	50 ml
Propargite 790 g/l	EC	75 ml
Phosmet %50	WP	120 g
Fenpyroximate 50 g/l	EC	50 ml (<i>P. ulmi</i> 'ye karşı)
Fenazaquin 200 g/l	SC	50 ml (<i>T. viennensis</i> ve <i>P. ulmi</i> 'ye karşı)
Fenpropathrin 185 g/l	EC	25 ml (<i>P. ulmi</i> ve <i>T. viennensis</i> 'e karşı)
Malathion % 25	WP	500 g
Malathion 190g/l	EC	500 ml
Methiocarb % 50	WP	100 g
Fenpropathrin 50 g/l + Hexythiazox 25 g/l	EC	50 ml (<i>P. ulmi</i> 'ye karşı)
Pyridaben % 20	WP	50 g (<i>P. ulmi</i> 'ye karşı)

Pyridaben % 20	WP	75 g (<i>T. urticae</i> 'ye karşı)
----------------	----	-------------------------------------

* Yassı akara karşı kullanılmaz.

** Kışlayan yumurtalara karşı tavsiye edilir.

Tetradifon: Bir mevsimde 3 defadan fazla kullanılmaz.

4-ALTIN KELEBEK (*Euproctis chrysorrhoea* L.) (Lep.: Lymantriidae)'E KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100ltsuva
Bacillus thuringiensis 16000 IU/mg	WP	50 g
Diazinon185 g/l	EC	200 ml
Malathion 190g/l	EC	500 ml
Malathion 650 g/l	EC	125 ml
Azinphos-Methyl %25	WP	200 g
Carbaryl %50	WP	200 g

5-AMERIKAN BEYAZ KELEBEĞİ (*Hyphantria cunea* Drury) (Lep.: Arctiidae) 'NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100ltsuva
Bacillus thuringiensis 16.000 IU/mg	WP	50 g
Endosülfan % 32.9, 360 g/l	WP,EC	300 g,300 ml .
Carbaryl % 50	WP	200 g
Azinphos-methyl 230'g/l	EC	200 ml
Azinphos methyl % 25	WP	200 g
Chlorpyrifos ethyl 480 g/l	EC	100 ml
Methidathion 426 g/l	EC	100ml
Chlorpyrifos ethyl % 2	Toz	150-200 g/ağaç
Diflubenzuron % 25	WP	20 g
Triflumuron % 25	WP	80 g/ da (Fındık'ta)

6-ARMUT KAPLANI (*Stephanüs pyri* (Fabr.) (Het.: Tingidae) ' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
*Phosalone %3Ö	WP	200 g
*Phosalone 350 g/l	EC	150ml
Malathion 190g/l	EC	300 ml
Malathion 650 g/l	EC	100ml
Malathion %25	WP	200 g
Dia/inon 185 g/l	EC	200 ml
Diazinon 630 g/l	EC	75 ml
**Azinphos methyl 230 g/l	EC	200 ml
**Azinpho.s methyl %25	WP	200 g
Oxydemeton-methyl 265 g/l	EC	100 ml
Dimethoate 400 g/l	EC	80 ml
Parathion methyl 360 g/l	EC	100ml
Fenthion 525 g/l	EC	150ml
Omethoate 565 g/l	EC	100ml
Chlorpyriphos-ethyl 480 g/l	EC	150ml
Prothoate 390 g/l	EC	125ml

* Bal arısı olan yerlerde arılara zehirsiz olduğu için tercihen bu ilaçlar kullanılmalıdır.

**Kırmızıörümcek problemi olan yerlerde kullanılmaz.

7-ARMUT KIRMIZI KABUKLUBİTİ (*Epidiaspis leperii* (Sign.) (Hom.: Diaspididae) 'NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Fonnülasyonu	Dozu (Preparat)100ltsuva
Petrol yağı 650 g/l +DNOC 15 g/l	Sıvı	95 lt snya 5 lı
Yazlık yağlar 850 g/l	Sıvı	1 lt

Azinphos-Methyl %25	WP	200 g
Ethion 500 g/l	EC	150 ml
Methidathion 426 g/l	EC	75 ml
Chlorpyrifos-ethyl 480 g/l	EC	100ml

8-ARMUT PSİLLİDİ (*Cacopsylla pyri* L. (Hom.: Psyllidae)' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
"Amitraz 200 g/l	EC	300 ml
* Phosalone 350 g/l	EC	200 ml
*Diflubenzuron % 25+ BitkiselYağ 25+ BitkiselYağ WP+Sıvı	WP+Sıvı	40 g + 300 ml
Azinphos methyl 230 g/l	EC	200 ml
Deltamethrin 25 g/l	EC	50 ml
Cypermethrin 250 g/l •	EC	20 ml
Fenvalerate 190 g/l	EC	30 ml
Methidathion 426 g/l	EC	100ml
*Yazlıkyağ850g/l+ Malathion 190g/l	EM	1 lt + 300 ml
Imidacloprid 350 g/l	SC	40 ml

*: Doğal düşmanlara daha az olumsuz etkileri nedeni ile öncelikle önerilmelidir.

9- ARMUT YAPRAK UYUZU *Eriophyes pyri* Nal.) (Acarina : Eriophyidae)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Petrol yağı 650 g/l+DNOC 15 g/l	Sıvı	95 ltsuya 5 lt
Kükürt %73	WP	500 g
Oxydemeton - methyl 25 g/l	EC	150ml
Carbaryl % 50	WP	200 g
Endosülfan % 32.9	WP	150ml
Endosülfan 360 g/l	EC	150ml

10-BADEM İÇ KURDU (*Eurytoma amygdali* End. (Hym.: Eurytomidae)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
*Azinphos-methyl %2.5	Toz	700 g/ ağaç
*Azinphos-methyl 230 g/l	EC	200 ml
*Azinphos-methyl %25	WP	200 g
Endosülfan %5	Toz	500 g/ ağaç
Endosülfan 360 g/l	EC	150ml
Endosülfan %32.9	WP	150 g
Methiocarb %2	Toz	400 g/ ağaç
Methiocarb %50	WP	150 g

* Kırmızı örümceğin problem olduğu yerlerde akarısıyla birlikte kullanılmalıdır.

11-BAKLAZINI (*Epicometis hirta* (Poda) (Col.: Scarabaeidae)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) 100 lt suya
Endosülfan %32.9, 360 g/l	WP,EC	150 g, ml

12- ÇİLEKTE KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (*Tetranychus urticae* Koch., *T.cinnabarinus* Boisd.) (Acarina: Tetranychidae)' E KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) 100 lt suya
Dicofol 195g/l	EC	200 ml
Dicofol 195 g/l+ Tetraditbn 752 g/l	EC	150ml+ 150ml

Bromopropylate 500 g/l	EC	100 ml
Azocyclotin % 25	WP	125 g

13- DOĞU MEYVE GÜVESİ (*Cydia molesta* (Busck.) (Lep.: Tortricidae)' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) 100 lt suya
Azinphos methyl 230 g/l	EC	200 ml
Azinphos methyl % 25	WP	150 g
Carbaryl 50 g/l	EC	200 ml
Carbaryl % 85	WP	120 g
Parathion methyl 360 g/l	EC	100ml
Diazinon 185-630 g/l	EC	200,75 ml
Phosalone 350 g/l	EC	200 ml
Malathion 190g/l	EC	300 ml
malathion 650 g/l	EC	100ml
Malathion % 25	WP	250 g
Phosalone % 30	WP	200 g
Omethoate 565 g/l	Sc	200 ml

14-DUT KABUKLU BİTİ (*Pseudaulacaspis pentagona* (Targ.-Tozz.) (Hom.: Diaspididae)' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) 100lt suya
a) Kış savaşı		
Petrol yağı 650 g/l + DNOC 15 g/l	Sıvı	95 lt suya 5 lt (Yumuşak çe-kirdekli meyve ağaçlarında) 95.5 lt suya 4.5 lt (Sert çekir-dekli meyve ağaçlarında)
b) Yaz savaşı		
Yazlık yağlar 700 g/l	Sıvı	1000ml
Methidathion 426 g/l	EC	75 ml
Chlorpyrifos-ethyl 480 g/l	EC	100ml
Ethion 500 g/l	EC	150ml
Azinphos methyl %25	WP	200 g

15-ELMA AĞKURDU (*Yponomeuta malinellus* Zell.)(Lep.: Yponomeutidae)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) 100 lt suya
<i>Bacillus thuringiensis</i> 16.000IU/mg	WP	25 g
Endosulfan %32.9	WP	200 g
Diazinon 630 g/l	EC	70 ml
Diazinon 185 g/l	EC	150ml
Malathion 650 g/l	EC	200 ml
Malathion 500 g/l	EC	200 ml
Malathion %25	WP	400 g
Parathion-methyl 360 g/l	EC	20 ml
Prothoate 190g/l	EC	125ml
Fenitrothion 550 g/l	EC	150ml
Fenitrothion %40	WP	200 g
Omethoate 565 g/l	EC	100ml
Phosmet %50	WP	60 g

Phosphamidon 500 g/l	SCW	40 ml
Phosphamidon 200 g/l	EC	100 ml
Trichlorphon 600 g/l	EC	200 ml
Trichlorphon % 80	SP	200 g
Fenvalerate 190 g/l	EC	5ml
Permethrin 250 g/l	EC	50 ml
Etrintbs 520 g/l	EC	150ml
Deltamethrin 25 g/l	EC	5ml
Alphacypermethrin l�Og/l	EC	15 ml
Formothion 336 g/l	EC	150ml
Azinphos-methyl % 25	WP	200 g
Malathion 190g/l	EC	500 ml
Methiocarb % 50	WP	100 g
Carbaryl% 85	WP	120 g
Phosalone % 30	WP	200 g
Phosalone 350 g/l	EC	200 ml
Fenthion 525 g/l	EC	100ml
Lambda - Cyhalothrin 50 g/l	EC	10ml

16-ELMA G VDE KURDU (*Synanthedon myopaeformis* (Bork.) (Lep.: Sesiidae)' NA KARŐI  NERİLEN İLA LAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Form�lasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Chlorpyrifos ethyl 480 g/l	EC	125ml
Dichlorvos 550 g/l	EC	200 ml
Endos�lfan 360 g/l, %32.9	EC,WP	150ml,g
Methidathion 426 g/l, % 40	EC,WP	125 ml,100g
Azinphos - methyl 230 g/l	EC	200 ml

17-ELMA İ  KURDU (*Cydia pomonella* L.) (Lep.: Tortricidae)' NA KARŐI  NERİLEN İLA LAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Form�lasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Diflubenzuron % 25	WP	40 g
Phosalone %30;350 g/l	WP,EC	200 g, 100ml
Azinphos-methyl 230 g/l, %25	EC,WP	200 ml, g
Fenthion 525 g/l	EC	150ml
Methidathion 426 g/l, %40	EC,WP	100 ml, g
Chlorpyrifos-ethyl 480 g/l	EC	150ml
Carbaryl %50,85	WP	200,120 g
Fenvalerate 190 g/l	EC	10 ml
Deltamethrin 25 g/l	EC	10 ml
Cypermethrin 200,250 g/l	EC	25, 20 ml
Permethrin 250 g/l	EC	50 ml
Bit'enthrin 100g/l	EC	20 ml
Alphacypermethrin 100g/l	EC	20 ml
Fenprothrin 185 g/l	EC	15 ml
Triflumuron %25	WP	40 g
Lambda – Cyhalothrin 50 g/l, 25	G/l EC	20 ml, 30 ml
Omethoate 565 g/l	EC	100ml
*Triazophos 420 g/l	EC	100ml
Methiocarb % 50	WP	200 g

Etrimfos 520 g/l	EC	150ml
Phosmet %50	WP	150 g
Tau-fluvalinate 240 g/l	EC	30 ml
Hexaflumuron 100g/l	EC	50 ml
Tralomethrin 36 g/l	EC	35 ml
Esfenvalerate 50 g/l	EC	10 ml

*Amasya elma çeşidinde fitotoksiktir.

18-ELMA PAMUKLU BITİ (*Eriosoma lanigerum* (Housm.) (Hom.: Pemphigidae)" NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suva
Phosalone 350 g/l	EC	200 ml
Phosalone % 30	WP	200 g
Diazinon 185 g/l	EC	200 ml
Diazinon 630 g/l	EC	75 ml
Malathion 190g/l	EC	300 ml
Malathion 650 g/l	EC	100ml
Methidathion 426 g/l	EC	80 ml
Formothion 336 g/l	EC	150ml
Bromophos 360 g/l	EC	125ml
Dichlorvos 550 g/l	EC	200 ml
Dimethoate 400 g/l	EC	100ml
Fenitrothion 550 g/l	EC	100ml
Omethoate 565 g/l	EC	125ml
Parathion methyl 360 g/l	EC	100 ml
Oxydemeton-methyl 265 g/l	EC	100ml
Azinphos - methyl % 25	WP	200 g
Endosültan % 32.9	WP	200 g

19-ERİK İÇKURDU (*Cydia funebrana* (Treit.) (Lep.: Tortricidae)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100ltsuya
Phosalone 350 g/l	EC	200 ml
Phosalone %30	WP	200 g
Azinphos Methyl %25	WP	200 g
Azinphos Methyl 230 g/l	EC	200 ml
Carbaryl %50	WP	200 g
Trichlorphon %80	SP	100g

20-ERİK KOŞNİLI (*Sphaerolecanium prunastri* (Boy.) (Hom.: Coccidae)' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100lt suya
Kış Mücadelesi		
Petrol yağı 650 g/l +DNOC 15g/l	Sıvı	95.51tsuya4.51t
Yaz Mücadelesi		
Malathion 190g/i	EC	300 ml
Malathion % 25	WP	300 g
*Yazlık yağ 700 g/l	Sıvı	1.5 lt
*Yazlık yağ 850 g/l	Sıvı	1,2 lt

*: Doğal düşmanların korunması açısından bu ilaçlar tercih edilmelidir.

21- İKİKABARCIKLI KOŞNİL (*Palaeolecanium bituberculatum* Targ.) (Hom.: Coccidae)' E KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) 100 lt suya
Malathion 190g/l	EC	400 ml
Azinphos-methyl 230 g/l	EC	200 ml
Fenthion 525 g/l	EC	150ml
Chlorpyritbs-ethyl, 480 g/l	EC	150ml
Oxydemeton-methyl 265 g/l	EC	100ml
EPN 490 g/l	EC	50 ml
Yazlık yağ 850 g/l	EC	1.5 lt

22- KAHVERENGİ KOŞNİL (*Parthenolecanium corni* Beuete) (Hom.: Coccidae)' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Yazlıkyağ 850g/l	EC	1.2lt
Methidathion 426 g/l	EC	75 ml
Methoate 565 g/l	EC	75 ml
Azinphos-methyl 230 g/l	EC	200 ml
Azinphos-methyl % 25	WP	200 g
Chlorpyrifos - ethyl 480 g/l	EC	150ml

23-KAMBUR ÜÇGENBÖCEĞİ (*Ceresa bubalus* F.) (Hom.: Membracidae) ' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) Dekara
Malathion %2	Toz	3kg
Carbaryl %5	Toz	3kg

24-KESTANE İÇKURTLARI Kestane içkurdu (*Cydia splendana* (Hbn.) (Lep.: Tortricidae) Kestane hortumlu böceği (*Curculio elephas* (Gyll.) (Col.: Curculionidae)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)1m ² gömü alanına
Endosülfan % 32,9	WP	20 g

25-KİRAZ SİNEĞİ (*Rhagoletis cerasi* L.) (Diptera: Tephritidae)' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Yumurta ve bilhassa larvaya karşı yapılan bir ilaçlama yöntemidir.		
Bromophos 360 g/l	EC	125ml
Malathion %25	WP	250 g
Malathion 650 g/l	EC	100 ml
Malathion 190g/l	EC	300 ml
Diazinon 185 g/l	EC	200 ml
Diazinon 630 g/l	EC	75 ml
Trichlorfon 600 g/l	EC	100 ml
Cartap % 95	SP	130 g

Zehirli yem ve dal ilaçlaması

Enfeksiyonunun yüksek olmadığı ve kiraz sezonunun yağışsız geçtiği kurak bölgelerde erginlere karşı koruyucu olarak, özellikle ilk ve hasada yakın ilaçlamalarda ögütlenebilir. Kullanılacak cezbedici kombinasyonu aşağıda verildiği gibidir:

100 lt suya, Malathion % 25 WP, 400 g + Hidrolize protein , 500 g

26-KİRAZSÜLÜĞÜ (*Caliroa limacina* Retz. (Hym.: Tenthredinidae)" NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
---------------------------	--------------	----------------------------

Diazinon 185 g/l	EC	200 ml
Malathion 190g/l	EC	200 ml
Azinphos-methyl 230 g/l	EC	200 ml
Azinphos-methyl %25	WP	100g
Formathion 336 g/l	EC	150ml

27- MEYVE AĞACI DİP KURTLARI (*Capnodis* spp. (Col.: Buprestidae)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) 100 lt suya
Dimethoate 400 g/l	EC	200 ml
Oxydemeton- methyl 265 g/l	EC	150ml
Azinphos - methyl 230 g/l	EC	200 ml

28-MEYVE AĞAÇLARI VE FİDANLARDA TOPRAKALTI ZARARLILARI' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat) 1m ² taç izdüşüm alanına
Endosülfan %32,9	WP	8g
Chlorpyritbs-ethyl %25	WP	15g

29-MEYVE GÖZ KURTLARI Elma gözkurdu (*Anthonomus pomorum* L.) (Col.: Curculionidae) Badem gözkurdu (*A.amygdali* Hust.) (Col.: Curculionidae) ' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Diazinon 185 g/l	EC	250 ml
Diazinon 630 g/l	EC	75 ml
Carbaryl %50	WP	200 g
Carbaryl %5	Toz	2,5 kg/da
Endosülfan 360 g/l	EC	150ml
Malathion 190g/l	EC	300 ml
Malathion 650 g/l	EC	100 ml
Malathion %25	WP	250 g

30 -MEYVE TESTERELİ ARILARI Armut testereliarısı (*Hoplocampa brevis* (Klug) (Hym.: Tenthredinidae) Erik testereliarısı (*H.flava* (L.) (Hym.: Tenthredinidae) Elma testere'iarısı (*H. testudinea* Klug. (Hym.: Tenthredinidae) ' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Endosulfan 360 g/l +Parathion methyl 128 g/l	EC	100ml
*Dioxathion 240 g/l	EC	200 ml
*Endosülfan % 32.9, 360 g/l	WP,EC	200 g, 200 ml
*Phosalone 350 g/l	EC	200 ml
*Phosalone %30	WP	200 g
Malathion 190,650g/l	EC	400 ml, 125ml
Mcilathion % 25	WP	100 g
Fenthion 525 g/l	EC	150ml
Carbaryl % 50	WP	200 g
Parathion methyl 360 g/l	EC	100ml
Deltamethrin 25 g/l	EC	30 ml
Azinphos-methyl %25, 230 g/l	WP,EC	200 g, ml

* Bal arılarına toksisitesi nisbeten düşük ilaçlar.

31-SAN-JOSE KABUKLUBİTİ (*Quadraspidiotus perniciosus* Comst.) (Hom.: Diaspididae)' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
---------------------------	--------------	----------------------------

Kış Mücadelesinde		
Petrol yağı 65üç/l+DNüC15g/l	Sıvı	(Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında)95 lt suya 5 lt
Bitkisel Yağ % 85	Sıvı	(Sert Çekirdekli meyve ağaçlarında)95.5 ltsuya 4.5 lt2lt

Erken ilkbahar mücadelesinde:

Methidathion 426 g/l	EC	100ml
Yaz savaşımında:		
Methidathion 426 g/l, %40	EC,WP	75 ml. 100g
Chlorpyrifos ethyl 480 g/l	EC	150ml
Omethoate 565 g/l	SL	150ml
Ethion 500 g/l	EC	150ml
Carbosulfan 250 g/l	EC	150ml
Pho.smet % 50	WP	200 g
Quinalpho.s 250 g/l	EC	125ml

Fidan Fumigasyonu:

Seyyar fumigatuarlarda yapılacak olan fidan fumigasyonunda m^e 6 gram kağıda eni lırılmış olan HCN (siyan gazı) yarım saat süre ile uygulanmalıdır.

32-ŞEFTALİ GÜVESİ (*Anarsia lineatella* Zell.) (Lep.: Gelechiidae)' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Elkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Azinphos Methyl %25	WP	150 g
A/.inphos Methyl 230 g/l	BC	200 ı-nl
Maiathion 650 g/l	EC	150gl
Malathion %25	WP	250 g
Malathion 190g/l	EC	300 ml
Endor.ülr.n %32.9	WP	15ög
Trichlortbn %80	SP	130 g
Triazophos 420 g/l	EC	lëOml
Ethion 500 g/l	EC	200 ml
Phosalone %30	WP	200 g
Phosalone 350 g/l	EC	200 ml
Omethoate 565 g/l	SL	200 ml
Phosmet %50	WP	150g

33-ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLU BİTİ (*Nilotaspis halli* (Green) (Hom.: Diaspididae) ' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
a- Kış ilaçlaması:		
Petrol yağı 650 g/l+DNOC 15g/l	Sıvı	51t
b- Yaz ilaçlaması		
Yazlık yağlar 700 g/l	Sıvı	1.51t
Yazlık yağlar 850 g/l	Sıvı	1.21t
Malathion %25	WP	250 g
Malathionı 190 g/l	EC	300 ml
Malathion 650 g/l	EC	100ml
Malathion 500 g/l	EC	100ml
Azinphos methyl %25	WP	200 g
Azinphos methyl 230 g/l	EC	200 ml
Dimethoate 400 g/l	EC	150ml
Chloropyrifos ethyl 480 g/l	EC	150ml
Fenthion 525 g/l	EC	150ml
Ethion 500 g/l	EC	150ml
Methidathion 426 g/l	EC	100ml

34-TOMURCUK TIRTILLARI Yaprak yeşil tırtılı (*Hedya nubiferana* (Haw) (Lep.: Tortricidae) Kırmızı tomurcuktırtılı (*Spilonota ocellana* (Schiff.) (Lep. Tortricidae) Küçük tomurcukgüvesi (*Recurvaria nanella* Hiibn.) (Lep. Gelechiidae) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Endosülfan 360 g / l	EC	150ml
Diazinon 185g/l	EC	200 ml
Diazinon 630 g/l	EC	75 ml
Malathion 190g/l	EC	400 ml
Malathion 650 g/l	EC	125ml
Azinphos methyl % 25	EC	200 ml
Azinphos methyl 230 g/l	WP	200 g
Parathion methyl 360 g/l	EC	100ml
Fenitrothion 550 g/l	EC	150ml
Thiometon 244 g/l	EC	100ml
Deltamethrin 25 g/l	EC	30 ml
Oxydemeton-methyl 265 g/l	EC	100ml

35-VİRGÜL KABUKLU BİTİ (*Lepidosaphes ulmi* (L.) (Hom.: Diaspididae) 'NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Kış ilaçları:		
Petrol yağı 650 g/l + DNOC15g/l	Sıvı	(Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında) 95 lt suya 5 lt
Petrol yağı 650 g/l+ DNOC 15g/l	Sıvı	(Sert çekirdekli meyve ağaçlarında) 95.5 Itsuya 4.5 lt
Yaz ilaçları:		
Ya7.1ıky yağlar700g/l	Sıvı	1.5 lt
Yazlık yağlar 850 g/l	Sıvı	1.2lt
Azinphos-methyl 230 g/l	EC	200 ml
Azinphos-methyl %25	WP	200 g
Fenthion 525 g/l	EC	150ml
Methidathion 426 g/l, %40	EC,WP	l6Oml-100g
Ethion 500 g/l	EC	150ml
DNOC Ammonium 615 g/l	EC	400 ml

36-YAPRAK BİTLERİ Elma yeşil yaprakbiti (*Aphis pomi* Deg.) (Hom.: Aphididae) Elma gri yaprakbiti (*Dysaphis plantaginea* (Pass.) (Hom.: Aphididae) Kırmızı galyaprakbitleri (*Dysaphis* spp.) (Hom.: Aphididae) Şeftali yıprakbiti (*Myzus persicae* (Sulz.) (Hom.: Aphididae) Erik unlu yaprakbiti (*Hyalopterus pruni* (G.) (Hom.: Aphididae) Şefta^ gövde kanlıbiti (*Pterochloroides persicae* (Chol.) (Hom.: Aphididae)' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100Itsuya
Pirimicarb %50	WP	50 g (<i>A pomi</i> 'ye karşı 30 g)
Phosalone 350 g/l	EC	200 ml
Phosalonr %30	WP	200 g
Oxydemeton-methyl 265 g/l	EC	100 ml (<i>A .pomi</i> 'ye karşı 25 ml)
Fenitrothion 550 g/l	EC	100ml
Fenitrothion % 40	WP	150 g (<i>H.pruni</i> 'ye karşı)
Parathion-methyl 360 g/l	EC	100 ml (<i>A. pomi</i> 'ye karşı 25 ml)
Parathion-Methyl 128g/l	EC	100 ml (<i>H. pruni</i> 'ye karşı 150 ml)
Malathion 190,650g/l	EC	400,125 ml
Malathion %25	WP	300 g
Diazinon 185,630g/l	EC	200,75 ml
Dichlorvos 550 g/l	EC	200 ml

Dimethoate 400 g/l	EC	100ml
Bromophos 360 g/l	EC	125ml
Fornathion 336 g/l	EC	150 ml (<i>Dysaphis</i> spp.'ye karşı)
*Omethoate 565 g/l	EC	125ml
Methidathion 426 g/l	EC	75 ml
Carbosulfan 250 g/l	EC	125 ml (<i>A.pomi</i> 'ye karşı)
Fenthion 525 g/l	EC	100ml
Endosulfan 300 g/l+**Tau-fluvalinate, 240 g/l	EC	10 ml
Chlorpyritbs ethyl 480 g/l	EC	150 ml
Chlorpyritbs-methyl 235 g/l	EC	400 ml
Phosphamidon 500 g/l	SC	60 ml
Thiometon 244 g/l	EC	100 ml (<i>Dysaphis</i> spp.'ye karşı)
Thiometon 244 g/l	EC	125 ml (<i>A. pomi</i> 'ye karşı)

* : Şeftali ağaçlarında fitotoksite yapabilir.

** : Elma Yeşil Yaprakbiti ve Şeftali Yaprakbitine karşı tavsiyedir.

37 YAPRAK BÜKENLER Elma yaprakbükeni (*Archips rosanus* L. (Lep.: Tortricid'-e) Adi yaprakbükücüsü (*A. xylosteus* L.) (Lep.: Tortricid'-e) ' K KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyon	Dozu (Preparat)100 lt suya
Phosalone 350 g/l	EC	170ml(Kirazda)
Phosalone %30	WP	200g(Kirazda)
Endosulfan % 32.9	WP	150g
Fenitrothion 550 g/l	EC	150 ml
Fenitrothion %4G	WP	200 g
Azinphos metil %25	WP	200 g
Azinphos methyl 230 g/l	EC	150 ml
Diazinon 630 g/l	EC	70 ml
Diazinon 185 g/l	EC	150ml
Malathion %25	WP	250 g
Malathion 650 g/l	EC	100ml
Dioxathion24ö/g/l	EC	200 ml
Chlorpyritbs-ethyl 480 g/l	EC	100ml (Elmada)
Cypermethrin 200 g/l	EC	25ml
Parathion - methyl 360 g/l	EC	100ml
Elrimtbs 520 g/l	EC	150ml
Permethrin 250 g/l	EC	50 ml

38 -YAPRAK GALERİ GÜVELERİ: Elma yaprak oval galerigüvesi (*Phyllonorycter gerasimowi* (Hg.)) (Lep.: Gracillariidae) Fındık yaprak galerigüvesi (*P. corylifoliella* (Hw.)) (Lep.: Stigmellidae) Elma yaprak galerigüvesi (*Stigmella malella* (Stt.)) (Lep.: Stigmellidae) Meyve Yaprak galerigüvesi (*S.pyri* Glitz.) (Lep.: Stigmellidae) Kiraz yaprak galerigüvesi (*Lyonetia clerkella* (L.)) (Lep.: Lyonetiidae) Armut yaprak galerigüvesi (*Leucoptera scitella* Zell.) (Lep.: Lyonetiidae) Erik yaprak galerigüvesi (*Coleophora prunifoliae* Doets.) (Lep.: Coleophoridae)' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Endosulfan 360 g/l	EC	150ml
Methidathion 426 g/l	EC	100ml
Azinphos Methyl 230 g/l	EC	200 ml
Fenthion 525 g/l	EC	150ml
Parathion-methyl 360 g/l	EC	100ml
Omethoate 565 g/l	EC	150 ml
Trichlortbn %80	SP	100 g
Endosulfan 300 g/l +Parathion-methyl 128 g/l	EC	150ml

39 –YAZICI BÖCEKLER Meyve yazıcıböceği (*Scolytus rugulosus* Müll.) (Col.: Scolytidae) Badem yazıcıböceği (*S. amygdali* Guer.) (Col.: Scolytidae)' E KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
Carbaryl % 50	WP	200 g
Carbaryl % 85	WP	100 g
Methiocarb% 50	WP	150 g
Azinphos methyl % 25	WP	300 g

40- YÜZÜK KELEBEĞİ (*Malacosoma neustria* (L.) (Lep.: Lasiocampidae)' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100 lt suya
* <i>Bacillus thuringiensis</i> 16000IU/mg	WP	50 g
Azinphos - methyl, 230 g/l	EC	200 ml
Diazinon, 20	EC	200 ml
Carbaryl % 50	WP	200 g
Malathion.20	EC	400 ml
Malathion, 60	EC	125ml

41 -ZEYTİN KABUKLU BİTİ (*Parlatoria oleae* (Colv.) (Hom.: Diaspididae))' NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (Preparat)100lt suya
Chlorpyrifos-ethyl 480 g/l	EC	100ml
Methidathion 426 g/l	EC	100ml
Azinphos methyl % 25	WP	200 g
Azinphos methyl 230 g/l	EC	200 ml
Malathion 190g/l	EC	500 ml
Malathion 650 g/l	EC	150ml
Yazlık yağlar 700 g/l	Sıvı	1.5 lt